

علائم بیماری :

بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو از بیماریهای ویروسی قابل انتقال بین انسان و حیوان می باشد .

بیماری با تب ناگهانی ، بدون درد ، کوفتگی ، ضعف ، سردرد ، درد شدید عضلات ، بی اشتهاپی ، درد پشت حدقه چشم ، ترس از نور ، تهوع ، استفراغ ، گلودرد ، دل درد و تغییرات خلقی بصورت بی قراری و افسردگی ظاهر می شود .

علائم خونریزی معمولاً از روز سوم تا پنجم شروع می شود . خونریزی در مخاط ، لکه های خونریزی (پشتی) در قسمت بالای بدن ، خط زیر بغل ، محللهای تزریق و تحت فشار ایجاد می شود . خونریزی از اعضای مختلف بدن (بینی ، لثه ، مجاری ادرار ، روده ، رحم و ...) ایجاد می شود . بیماران بدحال از روز پنجم به بعد دچار نارسایی کبدی ، کلیوی می شوند .

علائم بیماری :

عامل بیماری ویروس بانیا ویریدا از گروه آربوویروسها تحت عنوان ویروسهای منتقله توسط بندپایان است .

مخزن بیماری :

گوسفند ، گاو ، بز ، خرگوش وحشی ، و شتر مرغ به عنوان مخزن بیماری مطرح هستند .

راه انتقال :

انتقال از طریق گزش کنه که یکی از راههای مهم ابتلا می باشد . کنه ها بخصوص گونه هیمالوما از طریق تخمدان آلوده در تمام مراحل رشد آلوده شده و عفونت زا می باشند . کنه بالغ ویروس را به نوزادان خود انتقال می دهد .

انسان نیز در اثر تماس مستقیم با خون و ترشحات یا بافتهای آلوده دام و یا تماس با ترشحات افراد بیمار مبتلا می شوند . در تماس نزدیک با دمهای آلوده از طریق تنفس نیز امکان ابتلا به بیماری وجود دارد .

گروههای در معرض خطر :

همه افراد جامعه احتمال ابتلا به بیماری را دارند . گروه پرخطر شامل : دامداران ، دامپزشکان ، کارمندان کشتارگاه و کارکنان بهداشتی درمانی (پزشک ، پرستار ، بهیار و ...) می باشند .

دوره کمون بیماری :

در صورت گزش کنه آلوده : ۳-۱ روز و حداکثر ۹ روز .

در صورت تماس با خون آلوده : ۶-۵ روز و حداکثر ۱۳ روز .

تشخیص :

تشخیص بیماری با جداسازی ویروس از خون در هفته اول بیماری ، بررسی آنتی بادی اختصاصی از طریق الیزا ، ایمونوفلورسنت آنتی بادی توسط خونگیری در سه مرحله صورت می گیرد :

نمونه اول : بلافاصله پس از تشخیص بیماری .

نمونه دوم : ۱۰-۵ روز بعد از بروز بیماری .

نمونه سوم : ۱۵-۱۰ روز بعد از بروز علائم .

درمان :

درمان حمایتی

(تزریق خون ، مایعات جایگزین ، پلاکت)

داروی ضد ویروس ریباویرین

دوز اولیه ۳۰ mg/kg

۱۵ mg/kg هر شش ساعت ۴ روز

۷/۵ mg/kg هر شش ساعت ۶ روز

مورد مشکوک شامل :

شروع ناگهانی تب ، درد عضلات ، خونریزی همراه با یکی از علائم اپیدمیولوژیک (سابقه گزش کنه ، تماس مستقیم با خون تازه و ترشحات بیمار مشکوک ، اقامت در محیط روستایی)

شبکه بهداشت و درمان شهرستان نی ریز
واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها

تب خونریزی دهنده کریمه کنگو



- شستن دستها قبل و بعد از تماس با بیمار .
- استفاده از دستکش قبل از تماس با بیمار و
تعویض دستکش جهت تماس با بیماران دیگر .
- پوشیدن دستکش قبل از تماس با خون و
ترشحات بدن بیمار و جلوگیری از تماس غشاهای
مخاطی و پوست آسیب دیده با خون و ترشحات بدن
بیمار .

- استفاده از ماسک و محافظ چشم و پوشیدن گان
چین انجام مراقبتهای پزشکی که احتمال پاشیدن خون
و مایعات بدن وجود دارد .

- مراقب باشید هنگام استفاده از سرسوزن ، تیغ
جراحی و سایر ابزارهای برنده آسیب نبینید .

- ضدعفونی وسایل دردمای ۶۰ درجه سانتیگراد به
مدت یک ساعت و یا استفاده از مواد ضدعفونی کننده
جهت وسایل و اشیاء حساس به حرارت (توسط اتیلن
اکسید) .

از خریدن گوشتهای بازرسی نشده
و بدون مهر دامپزشکی (کشتار غیرمجاز)
خودداری کنید .

به محض مشاهده مورد مشکوک :

آزمایش شمارش سلولهای خون محیطی انجام و
در صورتی که پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ باشد بلافاصله
باید به مرکز بهداشت شهرستان جهت بررسی و درمان
فرد ، تهیه خون و پیگیری اطرافیان گزارش داده شود .

راههای پیشگیری از بیماری :

گروهی که در تماس با دام هستند

روشهای حفاظت شخصی در تماس با ترشحات و
خون حیوان :

- پوشیدن دستکش ، لباس بلند ، کلاه ، ماسک و
عینک .

روشهای حفاظت شخصی از گزش کنه :

- استفاده از مواد دافع حشره و کنه .

- پوشیدن لباس روشن .

- در مناطقی که احتمال خطر گزش کنه وجود دارد
هر ۲ تا ۴ ساعت تمام بدن از نظر وجود کنه چک شود.

- اقدامات کنترل شیمیایی کنه (سمپاشی ، استفاده
از حمام کنه با هماهنگی دامپزشکی) .

گروهی که در تماس با بیمار هستند

رعایت احتیاطهای استاندارد :